



CRIPION BIOTECNOLOGIA LTDA.

Informações do Produto

Leibovitz's L-15 Modificado (L15B300)

Com adição de Glicose, L-Glutamina, Fenol Vermelho, Piruvato de Sódio, Caldo Triptose e Lipoproteína. Sem HEPES, Bicarbonato de Sódio e Soro Fetal Bovino.

Líquido, Estéril filtrado, adequado para cultura celular.

Número de Catálogo: DC1281

Apresentação: 500ml e 1000ml

Descrição do produto:

O meio L-15(Leibovitz)é formulado para seu uso em sistemas livres de dióxido de carbono (CO2) que requerem a adição de bicarbonato de sódio. O L-15 possui um tampão salino, assim como a substituição da glicose pela galactose ajuda a manter o controle fisiológico do pH. A presente modificação do meio L-15 é usada para cultura de células de carrapatos e produção de Anaplasma, Erlichia e Rickettsia. Não é necessário adaptar as linhas celulares ao meio utilizado para cultura bacteriana. Na verdade, as linhas celulares não funcionam bem quando cultivados continuamente na presença de bicarbonato, produzindo baixo número de rickettsias.

Composição

Amino ácidos

	(mg/L)
Glycine	220.0
L-Alanine	225.0
L-Arginine	500.0
L-Asparagine	250.0
L-Aspartic acid	299.0
L-Cysteine	120.0
L-Glutamine	300.0
L-Glutamic Acid	500.0
L-Histidine	250.0
L-Isoleucine	250.0
L-Leucine	125.0
L-Lysine	75.0
L-Methionine	75.0
L-Phenylalanine	125.0
L-Proline	150.0
L-Serine	200.0
L-Threonine	300.0

L-Tryptophan	20.0
L-Tyrosine	300.0
L-Valine	100.0
Vitaminas	
Ascorbic	10.0
Biotin	0.10
Choline chloride	1.0
Cyanocobalamine b12	0.50
D-Calcium pantothenate	1.0
Folic Acid	1.0
Niacinamide	1.0
Paraminobenzoic Acid	0.10
Pyridoxine hydrochloride	1.0
Riboflavin	0.1
Thiamine monophosphate	1.0
i-Inositol	2.0
Sais Inorgânicos	
Calcium Chloride	140.0
Cobalt Chloride	0.20
Cupric Sulfate	0.20
Magnesium Chloride	93.7
Magnesium Sulfate	97.67
Magnesium Sulfate H2O	1.60
Potassium Chloride	400.0
Potassium Phosphate monobasic	60.0
Sodium Chloride	8000.0
Sodium Molibdate	0.20
Sodium Phosphate dibasic	190.0
Sodium Selenite	0.20
Sultare Ferric	0.50
Zing sulfate	2.0
Outros Componentes	
D+ Glucose	2239.0
Glutathione Reduced	10.0



CRIPION BIOTECNOLOGIA LTDA.

Informações do Produto

Leibovitz's L-15 Modificado (L15B300)

Com adição de Glicose, L-Glutamina, Fenol Vermelho, Piruvato de Sódio, Caldo Triptose e Lipoproteína. Sem HEPES, Bicarbonato de Sódio e Soro Fetal Bovino.

Líquido, Estéril filtrado, adequado para cultura celular.

Número de Catálogo: DC1281

Apresentação: 500ml e 1000ml

D+ Galactose	900.0	Conteúdo de endotoxinas
Phenol Red	10.0	≤ 1EU / ml
Sodium Pyruvate	550.0	
Bovine Lipoprotein Concentrate	1000	Validade:
Tryptose Phosphate Broth	100	12 meses

Indicações:

1. Meio Pronto para ser utilizado.
2. Adicione asépticamente suplementos estéreis conforme necessário e dispense a quantidade desejada de meio estéril em recipientes estéreis.
3. Se necessário, esterilize o meio imediatamente filtrando através de um filtro de membrana estéril com porosidade de 0,22 microns ou menos, usando pressão positiva em vez de vácuo para minimizar a perda de dióxido de carbono.
4. Conservar o meio líquido a 2-8°C e no escuro até à utilização.

Isenção de responsabilidade:

Os produtos não se destinam a uso diagnóstico ou terapêutico em seres humanos ou animais, salvo especificação em contrário.

Controle de Qualidade:

Aparência

Líquido cristalino laranja claro.

pH

7.60 -8.40

Osmolaridade

290.00 -320.00mOsm/Kg

Armazenar:

2 - 8°C

Armazenamento e Prazo de validade:

1. Os meios de cultura líquidos preparados devem ser armazenados a 2-8° C. Use antes do prazo de validade. Apesar das condições de armazenamento recomendadas anteriormente, certos líquidos podem apresentar alguns sinais de deterioração ou degradação. Isso pode ser indicado por mudança de cor, mudança de aparência, presença de partículas e nebulosidade.
2. O pH e a concentração de bicarbonato de sódio do preparo do meio são fatores críticos que afetam o crescimento celular. Isso também é influenciado pela quantidade de meio, volume de cultura e vaso utilizado (relação de superfície/volume). Por exemplo, em garrafas grandes, como o pH das garrafas de Roux, tende a aumentar perceptivelmente. Portanto, condições ótimas de pH, concentração de bicarbonato de sódio, razão de superfície e volume médio devem ser determinadas para cada tipo de célula de cultura.
3. Se necessário, suplementos podem ser adicionados ao meio antes ou após a esterilização do filtro, observando as precauções de esterilidade. O prazo de validade do meio dependerá da natureza do suplemento adicionado ao meio.



CRIPION BIOTECNOLOGIA LTDA.

Informações do Produto
